

Basfoliar® Kelp Duo SL

Biostimulant à base d'*Ecklonia maxima* et de micro-algues, pour sécuriser et maximiser votre potentiel de rendement




Basfoliar® Kelp Duo SL

- Biostimulant associant **deux technologies**, issues de macro & microalgues sélectionnées pour leurs richesses en composés essentiels au fonctionnement du végétal.
- Son rôle est clef dans l'implantation des cultures, en renforçant leurs capacités à exprimer pleinement leurs potentiels génétiques, notamment face aux stress climatiques.

1 **Extrait de micro-algues** : concentré en métabolites naturels (complexe CE-SPX) qui participe à la vitalité globale de la plante.

2 **Extrait d'*Ecklonia*** : forte concentration en auxines

A la nouaison, son application améliore la plasticité des parois cellulaires → effet grossissement des fruits



Composition


ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NFU 44-204

0,35 % de cuivre (Cu)
 0,7 % de fer (Fe)
 0,55 % de manganèse (Mn)
 0,025 % de molybdène (Mo)
 0,4% de zinc (Zn)
 60 % d'additif agronomique Basfoliar® Kelp SL
 28 % d'additif agronomique Basfoliar® Spyra SL

Bidon de 10 L

Retours terrain :

Bilan essais pluriannuel Basfoliar® Kelp Duo
2021, 2022, 2023, 2024 – Ugni Blanc
(9 essais)



Ce qu'il faut retenir :

En moyenne, l'application du Basfoliar® Kelp Duo montre une amélioration de :

- ✓ 13% de Poids/grappe
- ✓ 10% Poids/cep
- ✓ 12% Rendement

Positionnement culture : une gamme étoffée de l'implantation à la récolte



Préconisations d'usage

	Cultures	Doses	Applications
Viticulture & Arboriculture	Vigne	1,5 à 2 L/ha	Jusqu'à 3 applications post-floraison
	Arbres fruitiers	3 L/ha	Jusqu'à 3 applications post-floraison
	Fruits rouges petits fruits	2 L/ha	Jusqu'à 3 applications à partir de la mise à fruit
Cultures légumières & cultures industrielles	Cultures légumières	2 à 3 L/ha	Jusqu'à 3 applications post-floraison
	Betterave	1,5 à 2 L/ha	Jusqu'à 3 applications à partir du stade 6/8 feuilles
	Pomme de terre "consommation"	2 à 4 L/ha	- 1-2x 4 L/ha au stade émergence et renouvellement - 1-2x 2 L/ha après tubérisation
	Pomme de terre "primeur" et "semence"	2 à 4 L/ha	- 1-2x 2 L/ha au stade émergence et renouvellement - 1-2x 4 L/ha après au stade tubérisation

EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur www.quickfds.com

DESTINÉ AUX USAGES PROFESSIONNELS