



BIO3G



L'AGRONOME

NOVASTIM®**EN ARBORICULTURE, VIGNE ET MARAÎCHAGE****RÉSULTATS OBTENUS ENTRE 2021 ET 2024**Concentré de métabolites de *Bacillus subtilis*Souche propriétaire *Bacillus subtilis* EV LB S2LET'S
CULTIVATE
A FERTILE
FUTURE !**NOVASTIM® AMÉLIORE L'ÉTAT SANITAIRE ET LA CONSERVATION****SGS**

► NOVASTIM® sur raisins de table appliqué en 2 passages à 1 l/ha au stade apparition des boutons floraux [55] et 0,5 l/ha au stade nouaison à petit pois [70-75].

Rendement (t/ha)*Présence de maladies fongiques toutes confondues
% de grappes contaminées***Staphyt**
empower
science together

► NOVASTIM® sur fraisiers en pleine terre (variété Savana), appliqué en 4 passages à 0,5 l/ha par passage aux stades boutons verts [49-51], floraison [59-61], nouaison [70-71] et fruits verts [79-81].

Rendement (g/m²)*% de fruits atteints par le botrytis 7 jours après récolte*



Staphyt
empower
science together


► NOVASTIM® sur pêchers (variété Fédérica), appliqué en 2 passages à 1 l/ha au stade chute des pétales [66-67] et à 0,5 l/ha au stade fruits à 60% de la taille finale [75-77].

	% de différence NOVASTIM® par rapport au Témoin
Rendement récolte de 20 t/ha pour les 2 modalités	-
Fruits déclassés à la récolte	- 27 %
Fruits atteints par le botrytis 7 jours après récolte	- 23 %




► NOVASTIM® sur kiwis (variété Hayward) appliqué en 4 passages à 0,5 l/ha aux stades apparition des boutons floraux [51-55], floraison [65-66], nouaison /petits fruits [70-73] et fruits à 60 % de la taille finale [75-77], (rendement identique pour les 2 modalités 22 t/ha)

Perte de poids des kiwis après 12 semaines de stockage



► NOVASTIM® sur laitues appliqué en 4 passages à 0,5 l/ha 48 h après plantation puis tous les 10-15 jours lors du développement végétatif.

Essai plein champ



► NOVASTIM® sur choux-fleurs appliqué en 3 passages à 0,5 l/ha aux stades 3 feuilles étalées [13-15], puis plus de 9 feuilles étalées [19], jusqu'à la formation des pommes [32-49].

Résultats 10 jours après récolte et conservation au frigo.


La modalité NOVASTIM® est préservée des impacts de botrytis par rapport au témoin.

TÉMOIN NOVASTIM®




NOVASTIM® AMÉLIORE LA RÉSISTANCE AU STRESS HYDRIQUE

► NOVASTIM® sur tomates rondes, appliqué en 4 passages à 0,5 l/ha, 1^{er} passage après plantation puis tous les 10-15 jours jusqu'aux premiers fruits verts [16-79].




► NOVASTIM® sur laitues, en 4 passages à 0,5 l/ha, 1^{er} passage 48 h après plantation puis tous les 10-15 jours lors du développement végétatif.

BBCH 43 : la tête a atteint 30 % de sa taille finale




NOVASTIM® AMÉLIORE LA QUALITÉ DES RÉCOLTES

► NOVASTIM® sur poivrons en 2 passages à 0,5 l/ha en encadrement de floraison [51-61].



► NOVASTIM® sur concombres pleine terre sous serre, appliqué en 3 passages à 0,5 l/ha 1^{er} passage avant floraison [51] puis toutes les 3 semaines.




■ TÉMOIN


■ NOVASTIM®

AUTRES RÉSULTATS AVEC NOVASTIM®

► NOVASTIM® sur framboisiers appliqué en 3 passages à 0,5 l/ha du stade feuilles déployées à floraison [59-61].




► NOVASTIM® sur myrtilles appliqué en 2 passages à 1 l/ha en encadrement de floraison [59-61].




► NOVASTIM® sur pêchers (variété Fédérica), appliqué en 2 passages à 1 l/ha au stade apparition des boutons floraux [55] et à 0,5 l/ha au stade fruits à 60 % de la taille finale [75-77].

Parcelle implantée en 2014 à 667 pieds/ha, 3 m x 5 m, irrigation en goutte à goutte.



Gain avec NOVASTIM® par rapport au témoin



RETROUVEZ-NOUS ET SUIVEZ-NOUS SUR

